

PROGRAMME DE LA SANTÉ GÉNITALE DES BOVINS

Les suites de mise-bas

Déchirure des voies génitales postérieures

Lors d'extraction forcée, les déchirures du périnée ou des parois du vagin peuvent faire l'objet de graves complications microbiennes.

L'application de [Défi'Derm™](#) dès la fin de la mise-bas permet d'éviter la formation de foyers infectieux et accélérer la cicatrisation des tissus lésés.

Non délivrance

[Défi'Part™](#) à raison de 200 ml en une prise, 24 à 48 heures après la mise-bas, suffit le plus souvent à l'expulsion du placenta.

Infection de la cavité utérine

[Défi'Part™](#) = 100 ml /jour, voie buccale, pendant une semaine pendant la période où les pertes vaginales sont encore rosées.

Si les pertes sont devenues blanches, il est préférable de recourir à une antibiothérapie intra-utérine.

La période des pertes rosées se situe de 10 à 20 jours après la mise-bas et correspond à une forte activité de l'immunité innée de l'utérus.

Environ 1 semaine après l'arrêt de la prise de [Défi'Part™](#) des chaleurs apparaissent et signifient la pleine récupération de l'endomètre utérin et de son activité sécrétoire (prostaglandines PgF2).

Subœstrus et Repeat-breeding

Lorsque les chaleurs sont peu visibles ou si les cycles sont réguliers mais non féconds, il est recommandé de pratiquer le protocole suivant :

- [Défi'OL™BV](#) = 100 ml /jour pendant une semaine,

puis • [Défi'Hot™](#) = 20 ml /jour pendant la semaine suivante.

Il est souhaitable de mettre en place ce protocole dès le premier jour des chaleurs afin d'améliorer le cycle suivant.

Préparation d'un lot de génisses pour une 1ère insémination ou une 1ère saillie

- 1ère semaine = [Défi'OL™BV](#), 100 ml /jour /génisse,

- 2ème semaine = [Défi'Hot™](#), 20 ml /jour /génisse.

En règle général les "chaleurs" des génisses sont regroupées sur 4 à 5 jours après l'arrêt de la semaine de [Défi'Hot™](#).

La saillie avec un taureau est beaucoup plus commode à assurer que le recours à l'insémination artificielle.