

PROTOCOLES BEE'FULL® PLUS

Protocole	Période	Nombre de passages	Dosage	Fréquence	Notes supplémentaires
Standard pour réduire les pathogènes	Septembre	6 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	A utiliser après l'été pour diminuer la pression des pathogènes.
	Février-mars	3 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	A utiliser après l'hiver pour diminuer la pression des pathogènes.
Personnalisé pour réduire les pathogènes PATHOBEE	Selon diagnostic	Selon diagnostic	¼ L par colonie	Selon protocole adapté	Protocole basé sur les résultats du diagnostic PATHOBEE. <u>Commander le kit PATHOBEE</u> Recevoir l'analyse des résultats Appliquer le protocole Bee'Full Plus adapté
Développement d'essaim naturel ou artificiel	Mars-juin	4 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	Favorise le développement d'essaims naturels ou artificiels.
Renforcement entre transhumances	Printemps-été	2 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	Renforce les colonies entre les périodes de transhumance.
Renforcement en baisse d'activité	Toute l'année	6 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	Renforce les colonies durant les périodes de faible activité.
Élevage des reines	Mars-juin	6 à 8 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	Commencer un mois avant le début des opérations