

## PROCOLES BEE'FULL® PLUS

**Préparation du sirop :** Mélangez 8 ml de Bee'Full® Plus avec 1 litre de sirop de nourrissage 50/50 ou sirop Bee'Full Stimulation. (La quantité de Bee'Full Plus peut être adapté par nos experts prescripteur en fonction de l'état général de la colonie).

Protocole	Période	Nombre de passages	Dosage	Fréquence	Notes supplémentaires
Standard pour soutenir le système immunitaire	Septembre	6 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	A utiliser après l'été pour soutenir le système immunitaire et préparer la grappe hivernale.
	Février-mars	3 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	A utiliser après l'hiver pour favoriser le redémarrage de la colonie.
Personnalisé après analyse qPCR PATHOBEE	Selon diagnostic	Selon diagnostic	¼ L par colonie	Selon protocole adapté	Protocole basé sur les résultats du diagnostic PATHOBEE : 1. Commander le kit PATHOBEE 2. Recevoir l'analyse des résultats 3. Appliquer le protocole adapté selon l'état général du rucher
Développement d'essaim naturel ou artificiel	Mars-juin	4 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	Favorise le développement d'essaims naturels ou artificiels.
Renforcement entre transhumances	Printemps-été	2 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	Renforce les colonies entre les périodes de transhumance.
Renforcement en baisse d'activité	Toute l'année	6 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	Renforce les colonies durant les périodes de faible activité.
Élevage des reines	Mars-juin	6 à 8 passages	¼ L par colonie	Toutes les 48 heures	Commencer un mois avant le début des opérations