

Élevage de reines – Production et développement d'essaims

Fiche protocoles techniques

Bee'Full® Plus

Préparation du sirop avec Bee'Full® Plus :

Mélangez **12 ml de Bee'Full® Plus** avec **1 litre de sirop de nourrissage 50/50** ou sirop **Bee'Full® Stimulation**. *(La quantité de Bee'Full® Plus peut être adaptée par un prescripteur).*

Distribuez cette préparation aux colonies selon les indications ci-dessous.

Élevage de reines

Colonies concernées :

- Colonies **donneuses d'œufs** (colonies mères)
- Colonies **donneuses de spermatozoïdes** (colonies à mâles)
- Colonies **éleveuses**

Protocole

- **Application** : Donnez 1 litre de la préparation à chaque colonie
- **Fréquence** : Répétez l'application **toutes les semaines du début à la fin du protocole**

Période d'application

Début du protocole :

- 5 semaines avant premier picking

Fin du protocole :

- Colonies donneuses d'œufs et de spermatozoïdes : au dernier picking
- Colonies éleveuses : 3 semaines après le dernier picking



Production d'essaims

Colonies concernées :

- Colonies **donneuses d'œufs** (colonies mères)
- Colonies **donneuses de spermatozoïdes** (colonies à mâles)
- Colonies **éleveuses**
- Colonies **donneuses de paquets d'abeilles**

Protocole

- **Application** : Donnez 1 litre de la préparation à chaque colonie
- **Fréquence** : Répétez l'application toutes les semaines **du début à la fin du protocole**

Période d'application

Début du protocole :

- 5 semaines avant le premier picking

Fin du protocole :

- Colonies donneuses d'œufs et de spermatozoïdes : au dernier picking
- Colonies éleveuses et donneuses d'abeilles : 3 semaines après le dernier picking

Développement et contrôle des essaims

Étape : du picking à l'essaim sur 3 cadres

Protocole

- **Application** : Donnez ½ litre de la préparation à chaque essaim
- **Fréquence** : Répétez l'application toutes les semaines **jusqu'à l'obtention d'un essaim sur 3 cadres minimum (mise en vente)**

Contrôle sanitaire des essaims (recommandations)

- Contrôlez l'état sanitaire des essaims par analyse qPCR Bee'Full® Diag
→ Réaliser un contrôle sanitaire qPCR Bee'Full® Diag (1 analyse pour 20 à 30 essaims)
- Mise en vente des essaims uniquement si les résultats analytiques sont convenables

En cas de résultats non convenables

Étape : Poursuivre le développement des essaims jusqu'à 5 cadres

Protocole

- **Application** : Donnez ½ litre de la préparation à chaque essaim
- **Fréquence** : Répétez l'application toutes les semaines **jusqu'à l'obtention d'un essaim sur 5 cadres minimum (mise en vente)**
→ Réaliser un nouveau contrôle sanitaire qPCR Bee'Full® Diag (1 analyse pour 20 à 30 essaims)

Objectif du protocole

Soutenir la vitalité, la robustesse sanitaire et la qualité biologique :

- des colonies impliquées dans l'élevage des reines,
- des essaims destinés à la vente ou à l'installation.



Ingrédients
d'origine naturelle



Fabriqué en France



Conservation du
produit : 3 ans



Nos solutions