

Notice d'utilisation

Bee'Full® Plus

Aliment complémentaire pour abeilles

Description du produit

Bee'Full® Plus est un **aliment complémentaire liquide spécialement conçu pour les abeilles**. Il contribue à **soutenir leurs défenses naturelles (immunité innée)** et **accompagne les colonies durant les périodes clés de leur développement**. Bee'Full® Plus s'intègre dans une approche globale de la conduite du rucher, en complément des pratiques apicoles habituelles.



Avantages

- **Soutient les défenses naturelles (immunité innée)** des abeilles
- **Soutient le développement des colonies**
- **Aide à préparer la grappe hivernale**
- **Complète les apports de sirop par des oligo-éléments spécifiques à l'abeille** (Zn, Mn, Cu, Fe, Se), reconnus pour leur rôle dans la santé générale et l'immunité des colonies ainsi que par des composés aromatiques d'origine végétale.



Ingrédients
d'origine naturelle



Fabriqué en France



Conservation du
produit : 3 ans

Mode d'emploi - protocole standard

- **Préparation du sirop** : Mélangez **12 ml de Bee'Full® Plus** avec **1 litre de sirop de nourrissage 50/50** ou sirop Bee'Full® Stimulation. *(Le dosage peut être adapté selon l'état général de la colonie et le protocole conseillé.)*
- **Application** : Donnez 0.25 L de cette préparation à chaque colonie.
- **Fréquence** : Répétez l'application toutes les 48 heures selon le protocole d'application choisi (Fiche des protocoles techniques)

Protocoles d'application - Standard pour soutenir les défenses naturelles (immunité)

- **Fin d'été – Automne (mi-août – septembre – octobre)** : 6 passages – 0.25 L par colonie – Toutes les 48 heures (à utiliser après la saison apicole pour préparer la grappe hivernale)
- **Printemps (février – mars)** : 3 passages – 0.25 L par colonie – Toutes les 48 heures (à utiliser après l'hiver pour favoriser le redémarrage de la colonie).

(Le protocole peut être adapté en fonction de l'état sanitaire de la colonie et des résultats d'une analyse qPCR.)

Précautions d'emploi

- Agitez bien le flacon avant utilisation
- Incorporez progressivement Bee'Full® Plus en remuant dans le sirop
- Ne mettez pas de Bee'Full® Plus en présence de hausses

Composition

Composition : Eau, Complexe de sucres simples, Extraits d'algues marines.

Additifs nutritionnels : Oligo-éléments : Zinc, Manganèse, Cuivre, Fer, Sélénium.

Additifs sensoriels : Mélange de substances aromatiques.

Additifs technologiques : Gomme arabique, Gomme xanthane, Acide citrique.



Nos solutions

Fiche des protocoles techniques Bee'Full® Plus

PREPARATION du sirop avec Bee'Full® Plus

Mélangez selon le protocole choisi :

- **12 ml de Bee'Full® Plus avec 1 litre de sirop de nourrissage (N) 50/50 (PREPARATION N)**

ou uniquement pour l'hivernage
- **3 ml de Bee'Full® Plus avec 1 litre de sirop de stockage (S) 70/30 (PREPARATION S).**

Distribuez cette préparation aux colonies selon les indications du tableau ci-dessous.

(La quantité de Bee'Full® Plus peut être adaptée par un prescripteur en fonction de l'état général de la colonie).

Tableau : Protocoles techniques Bee'Full® Plus

Protocole	Période	Nombre de passages	Dosage	Fréquence	Notes
Standard – soutien de l'immunité	Août à octobre	6 passages	0.25 L préparation (N) par colonie	Toutes les 48h	A utiliser après l'été pour soutenir le système immunitaire et préparer la grappe hivernale
	Février à mars	3 passages	0.25 L préparation (N) par colonie	Toutes les 48h	A utiliser après l'hiver pour favoriser le redémarrage de la colonie
Personnalisé après analyse qPCR Bee'Full® Diag	Selon diagnostic	Selon diagnostic	Selon protocole adapté	Selon protocole adapté	Protocole et conseils adaptés aux résultats de l'analyse qPCR Bee'Full® Diag et aux informations transmises par l'apiculteur
Développement d'essaims naturels ou artificiels	Mars à juin	4 passages	0.25 L préparation (N) par colonie	Toutes les 48 heures	Favorise le développement des essaims
Renforcement entre transhumances	Printemps-été	1 à 2 passages	1.5 L préparation (N) par colonie	Une semaine entre 2 passages	Renforce les colonies entre les périodes de transhumance
Renforcement de colonie faible, ou période de baisse d'activité ou de disette	Mars à octobre	1 à 3 passages	1.5 L préparation (N) par colonie	Une à deux semaines entre 2 passages	Soutient les colonies lors des phases de faible activité
Relance de la colonie très faible	Toute l'année	1 à 2 passages	Par pulvérisation sur la colonie : 50 ml préparation (N)	Selon besoin	Aide à accompagner la reprise d'activité avant la mise en place du protocole standard (6 passages)
Nourrissage et protection pendant l'hiver	Automne	1 passage	10 à 20 L préparation (S) selon le poids de la colonie	Selon besoin	Complète l'alimentation de stockage, soutient les défenses naturelles et accompagne la préparation des colonies à l'hivernage, contribuant ainsi à limiter les facteurs de risque d'affaiblissement des colonies